

PRURIGOS

- ⊗ Papulas ou nódulos pruriginosos. São dx de exclusão;
- ⊗ Podem ser:
 - Actinico
 - Da AIDS
 - De Hebra
 - Estrófulo
 - Getationis
 - Nodular
 - Nodular pos escabiose
 - Paraneoplasico
 - Pigmentoso
 - Por picada
 - Vulgar do adulto

- ⊗ PRURIGO ACTINICO
- ⊗ Áreas expostas a luz, inicio precoce na infância, papulas isoladas, quando confluentes formam placas de aspecto eczematoso, causa prurido intenso com escoriações. Leva a fotofobia e conjuntivite e queilite.
- ⊗ Comum nos Andes acima de 1500m, em populações indígenas e mestiços. Bastante raro.
- ⊗ Pensar em fascies indígena pq só foi localizado nos Andes. Pequenas papulas com aspecto voltado para o violáceo, extremamente pruriginosas, em áreas de exposição solar.
- ⊗ Tem associação genética.

- ⊗ PRURIGO ESTROFULO
- ⊗ Descrito em 1813 por Bateman. Hipersensibilidade a picadas de inseto, ocorre em ccas de 0-2 anos, mais no verão, principalmente baixo nível socioeconômico, associado a animais domésticos e viagens.
- ⊗ Pulgas, pernilongos, ácaros e formigas e os pacientes tem altos níveis de IgE.
- ⊗ Papulo-nodulos de 3-10mm em áreas expostas encimadas por minúsculas vesículas, distribuição simétrica, em vários estádios evolutivos. Muito pruriginosas, duram 2-10 dias, podem ocorrer lesoes bolhosas, não há adenopatia.
- ⊗ Normalmente prevemos que cada picada tem uma lesão, mas podemos ter flare up de lesoes antigas, 75% dos casos tem associação com atopia, apesar da IgE estar aumentada, pode não ser a mediadora. É principalmente na raça branca.
- ⊗ Se for mais de 2 anos não chamamos de prurigo estrófulo. Algumas lesoes podem ser vesiculares.

⊗ PRURIGO GESTATIONIS

- ⊗ Antigo nome de DA é prurigo de Besnier – usado no continente europeu. Não confundir com **prurigo gestacional de Besnier** – causa desconhecida, hipótese de que seja induzido por antígenos produzidos na placenta, manifestação de dermatite atópica da gestante e talvez tenha relação com colestase hepática.
- ⊗ Começa no último trimestre da gestação e puerperio pode persistir se tiver restos placentários pq é hipersensibilidade a produtos secretados na placenta.
- ⊗ 50% das pacientes tem antecedente de atopia familiar.
- ⊗ Bx inespecífica. A grande maioria das bx de prurido são inespecíficas. A clínica que nos ajuda a diferenciar.

⊗ PRURIGO NODULAR POS ESCABIOSE

- ⊗ Forma nodular de escabiose em ccas de pouca idade ou adultos no genital. Pode ser persistente durando vários meses, inclusive em pacientes já tratados. Há sinal de Darier – flare up quando há estímulo de coceira.
- ⊗ Nos adultos ocorre bastante nas regiões genital – nódulos pruriginosos após surto de escabiose.

⊗ PRURIGO NODULAR DE HYDE

- ⊗ Lesões nodulares de 1 a 3cm de diâmetro em áreas fotoexpostas. Alguns autores consideram variedade de eczema, pode ter relação com DA, picada de inseto e atopia, stresse.
- ⊗ O que o diferencia é o tipo do paciente e faixa etária que é acometido. Normalmente entre 20-60 anos, se dá em superfície de extensão dos membros e pode ter superfície verrucosa.
- ⊗ Dx diferencial com líquen plano hipertrófico, penfigoide bolhoso nodular (antes do surgimento de bolhas e placas urticadas).
- ⊗ Não tem origem definida, pode ter relação com estresse, geralmente são dx de exclusão. Alguns acham que é variante de líquen plano hipertrófico. Mas só podemos chamar de líquen plano hipertrófico se acharmos liquenificação.
- ⊗ São nódulos verrucosos.
- ⊗ AP - Hiperqueratose com intenso infiltrado dérmico, hiperplasia vascular e neural (células de Schwann) – neuroma de Pautrier. Não tem alterações liquenoides que o configurem como líquen plano hipertrófico.

*Acima de 2 anos chamamos de hipersensibilidade a picada de inseto, não podemos mais chamar de estrófulo e para ser prurigo nodular de Hyde tem que ter nódulo, não pode ter só papula.

⊗ CAUSAS

- ⊗ Causas sistêmicas de prurido para qualquer um dos pruridos – IRC, doença hepática, linfoma, infecção por HIV, enteropatia glúten-sensível.
- ⊗ Doença hepática – hepatopatia crônica, hepatite C crônica ativa.
- ⊗ Doença gástrica – câncer gástrico, úlcera gástrica e H. pylori
- ⊗ Doença intestinal – doença celíaca, estrogiloidiase
- ⊗ HIV

- Ⓢ Linfomas
- Ⓢ Associação é quando tem algum vínculo e aumento de frequência desses quadros em quem tem tal quadro clínico. Quando tem causalidade investigamos a fundo, mas associação tem relação, achado.

- Ⓢ PRURIGO DE HEBRA
- Ⓢ Tbm é síndrome de hipersensibilidade a picada de inseto. Estrófulo tbm é isso, porem aqui é na raça negra. Tem atopia, altos níveis de IgE, baixo nível sócio-econômico.
- Ⓢ Mais relação com pulga e pode ter adenopatia, no estrófulo não tem adenopatia.
- Ⓢ Não precisa ter ate 2 anos de idade como no estrófulo, pode ser mais velho.

- Ⓢ PRURIGO PARANEOPLASICO
- Ⓢ Linfomas Hodgkin, leucemias linfoides de células T, Ca gástrico, Ca de ducto biliar. É um quadro bastante inespecífico.

- Ⓢ PRURIGO CRONICO DO ADULTO
- Ⓢ Urticaria crônica papulosa pode ser sinônimo (não confundir com urticaria pigmentosa da mastocitose). É um prurigo subagudo, não tem escoriação neurótica. Dermatite papulosa. Semelhante a prurigo nodular, com lesões menos elevadas. Natureza eczematosa ou casado pelas mesmas causas de prurido sistêmico.
- Ⓢ Tem associação com estresse e fatores psicológicos.

- Ⓢ PRURIGO PIGMENTOSA
- Ⓢ Papulas no tronco e pescoço que fica com hiperpigmentação reticulada e é mais comum no Japão, causa desconhecida.
- Ⓢ AP – inespecífica, as vezes liquenoide.
- Ⓢ IF – negativa.
- Ⓢ É comum eosinofilia no hemograma.

- Ⓢ PRURIGO DERMOGRAFICO
- Ⓢ Dermografismo sintomático onde há urticas, escoriações em local de pressão de roupas.

*é diagnóstico de exclusão quando não temos como comprovar outras patologias. É difícil cair em prova de título. Vamos diferenciar pela idade, raça, antecedente de atopia relevante, as evidências tem que ser contadas.